

SERVICIO:		Nº Historia Clínica:	
Unidad:		Nombre Paciente:	
Habitación:	Cama:	Fecha Nacimiento:	Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INCONTINENCIA URINARIA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?

DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi familiar / tutor / representante legal:			
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)	DNI	FIRMA	FECHA
De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre " MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO " para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento			
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)	DNI	FIRMA	FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consiste en la colocación de distintos materiales o inyección de sustancias alrededor de la uretra.

Sirve para corregir las pérdidas incontroladas de orina (incontinencia urinaria).

Se practican diferentes incisiones según la técnica empleada, aunque lo más frecuente es la práctica de incisiones en la vagina, muslos, periné y ocasionalmente, en la parte baja del abdomen.

En algunas mujeres, también puede ser necesario la corrección de defectos asociados a órganos próximos (útero, recto o vejiga).

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR

Mejoría en las pérdidas incontroladas de orina.

ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO

Una posibilidad sería la terapia de rehabilitación del suelo pélvico, pero en su caso consideramos que la mejor opción es la cirugía.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

La recuperación tras la intervención suele ser corta. Puede que necesite analgésicos y antibióticos.

Es posible que durante unos días necesite una sonda uretral. Una vez retirada la sonda, comenzará a orinar normalmente. Al principio podrá notar un poco de escozor, urgencia en orinar, etc., que desaparecerán a los pocos días.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

Continuar con las pérdidas de orina y con su repercusión negativa sobre su calidad de vida.

RIESGOS FRECUENTES

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

1. Molestias al orinar tras la retirada de la sonda.
2. Leve dolor, hematoma o inflamación en la zona intervenida.

Riesgos de mas gravedad:

1. Problemas derivados de la herida quirúrgica: infección, apertura de los puntos de sutura, fístulas temporales o permanentes, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales, intolerancia a los materiales de sutura, que puede precisar reintervención para su extracción, aumento (hiperestesias) o disminución (hipoestesias) de la sensibilidad de la zona, y/o molestias dolorosas (neuralgias).

2. Dificultad para orinar espontáneamente, por retención urinaria o por atrapamiento ureteral durante la cirugía. Puede precisar durante un tiempo el tratamiento con sondaje (autocaterismo intermitente) o incluso una nueva

intervención quirúrgica.

3. Lesiones vesicales y/o uretrales, con fístulas temporales o permanentes.
4. Molestias vaginales durante las relaciones sexuales.
5. Dolor en el pubis por infección del hueso (osteítis) del pubis.
6. Dificultad para aguantar las ganas de orinar (sensación de urgencia miccional).
7. Debilidad de los músculos de las piernas (paresias de cuádricep/psoas) o inflamación de los nervios próximos.
8. Sepsis e infección generalizada, que puede resultar grave.
9. Hemorragia tanto durante la intervención como después. Sus consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas dependiendo de su intensidad. Para tratarla puede ser necesario ponerle sangre y/o productos derivados de la misma (hemoderivados).
10. Perforación del recto, que puede obligar a realizar otra intervención quirúrgica.
11. Tromboembolismo venoso profundo o pulmonar y hemorragias digestivas. Pueden ocurrir incluso aunque se tomen medidas preventivas.
12. Reacciones alérgicas o efectos secundarios a los medicamentos que es preciso administrarle.

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS

RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

PACIENTE			
D/D^a			
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento			
NOMBRE / APELLIDOS	DNI	FIRMA	FECHA
FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE			
D/D^a			
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento			
TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE	DNI	FIRMA	FECHA
MÉDICO RESPONSABLE DR D/D^a			
DECLARO haber informado al paciente y al familiar, tutor o representante del mismo del objeto y naturaleza del procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.			
MÉDICO RESPONSABLE	DNI	FIRMA	FECHA