Criterios de Resultado	Indicadores	Criterios de Resultado	Indicadores				
	060205 Sed	1208 Nivel de depresión	120801 Estado de ánimo deprimido				
0602 Hidratación	060215 Ingesta adecuada de líquidos	1208 Nivel de deplesion	120805 Expresión de culpa inapropiada o excedida				
	060101 Presión arterial		121014 Preocupación por sucesos vitales				
0601 Equilibrio hídrico	060105 Pulsos periféricos	1210 Nivel del miedo	121031 Temor verbalizado				
	060117 Humedad de membranas y mucosas		121015 Preocupación por la fuente del miedo				
	070307 Fiebre		140403 Busca información para reducir el miedo				
0703 Severidad de la infección	070308 Dolor/ hipersensibilidad	1404 Autocontrol del miedo	140405 Planea estrategias para superar situaciones				
	-		temibles				
	00401 Horas de Sueño		130216 Expresa sentimientos sobre pérdida				
0004 Sueño	00404 Calidad del sueño	1302 Superación de problemas	130220 Verbaliza la realidad de la pérdida				
	00406 Sueño interrumpido						
	210201 Dolor referido						
2102 Nivel de dolor	210208 Inquietud						
	210209 Foco limitado						
	160505 Utiliza los analgésicos de forma						
605 Control del dolor	apropiada						
	160503 Utiliza medidas preventivas						
	130401 Expresa sentimientos sobre pérdida						
304 Resolución de la aflicción	130418 Comenta pérdida con seres queridos						
	130421 Expresa expectativas positivas futuro						

Gra	vemente	Sustancialment	te Modera	dament	Lever	mente	No				Nunca	Rarar	nente	A v	eces	Frecuentemente		Siempre
con	nprometido	comprometido	e		comp	rometido	com	prometido		dei	mostrado	demo	strado	demo	strado	demostrado	(	lemostrado
			compro	metido							1	2	2		3	4		5
Ninguno-	Escaso	Moderado	Sustancial	Extenso		4 E	tenso	Sustancial	Moderado	Escasoe	Ninguno			Grave	Sustancia	Moderado	Leve	Ninguno
1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5

#### INTERVENCIONES\*

# 4120 Manejo de líquidos

- Administración de terapia IV
- Instruir al paciente en estado de "nada por boca" si procede.

### 2314 Administración de Medicación IV

- Seguir los cinco principios de medicación
- Tomar nota del historial médico y del historial de alergias
- Preparar correctamente el equipo para la administración de medicación
- Verificar la colocación y permeabilidad del catéter IV en la vena
- Controlar el equipo IV, la velocidad del flujo y la solución a itnervalos regulares, según protocolo del centro.
- Verificar si se producen infiltrados y flebitis en el lugar de infusión.
- Documentar la adminstración de medicación y la respuesta del paciente

## 4020 Disminución de la hemorragia

- Determinar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre
- Vigilar de cerca al paciente por si se producen hemorragias

#### 1850 Mejorar el sueño

- Agrupar las actividades para minimizar el nº de despertares
- Ajustar el programa de administración de medicamentos para apoyar el ci sueño/vigilia.

### 1750 Cuidados perineales

• Aplicar compresas para absorber el drenaje, según se precise.

# 6540 Control de la infección

- Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados del paci
- Poner en práctica precauciones universales.
- Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal.
- Afeitar y preparar la zona, como se indica en la preparación para procedimientos invasivos y/o cirugía
- Garantizar una manipulación aéptica de todas las líneas IV.

#### 6550 Protección contra la infección

- Observar los signos y síntomas de infección sistémica y generalizada
- Facilitar el descanso

## 2210 Administración de analgésicos

- Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuentcia del analgésico prescrito.
- Comprobar el historial de alergias a medicamentos
- Instruir para que se solicite la medicación según necesidades para el dolor antes de que el dolor sea severo.

#### INTERVENCIONES COMUNES A TODOS LOS PALNES DE CUIDADOS

7310-Cuidados de enfermeria al ingreso

7920-Documentacion

6680-Monitorizacion de los signos vitales

7460-Proteccion de derechos del paciente

7370-Planificación 8140-Informe de turnos 8060-Transcripcion de ordenes

### INTERVENCIONES\*

### 5270 Apoyo emocional

- Comentar la experiencia emoscional con la paciente
- Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo
- Abrazar ao tocar a la paciente para proporcionarle apoyo.
- Animar a la paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza
- Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta
- Permanecer con la paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más ansiedad.

## 5290 Facilitar el duelo

- Idenbtificar la pérdida
- Fomentar lq expersión de sentimientos a cerca de la pérdida.
- Escuchar las expresiones de duelo
- Fomentar la identificación de los miedos más profundos respecto de la pérdida

#### 5240 Asesoramiento

- Establecer una relación terapeútica basada en la confianza y el respeto
- Demostrar simpatía, calidez v autenticidad
- Disponer la intimidad para asegurar la confidencialidad
- Proporcionar información objetiva según sea necesatio si procede

# 5820 Disminución de la ansiedad

- Utilizar un enfoque sereno de seguridad
- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento.
- Proporcionar información objetiva, respecto al diagnóstico, tratamiento y propmover la seguridad y reducir el miedo.

## 6950 Cuidados por el cese del embarazo

- Preparar física y psicológicamente a la paciente para el procedimiento de aborto.
- Explicar las sensaciones que podría experimentar la paciente
- Instruir acerca de lso signos de los que hay que informar (aumento de hemorragia, aumento de los dolores abdominales y eliminación de coágulos y tejidos).
- Proporcionar anlgésicos o antieméticos prescritos.
- Guardar todos los tejidos eliminados





# PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DEL PACIENTE CON ABORTO DIFERIDO Y LEGRADO

Espacio reservado para la etiquete identificativa

## DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE ESTANDAR

Mujer gestante entre 15-49 años. Acude hoy a consulta para control ecográfico y es diagnosticada de aborto diferido en gestante de menos de 22 semanas. En urgencias se pide preoperatorio urgente.

Trae vía obturada en MSI. Se mantiene en dieta absoluta. No presenta sintomatología, pero si gran afectación psicológica por la pérdida del

# TIEMPO MEDIA DE ESTANCIA HOSPITALARIA

24 40 1			
24-48 horas			

**ALERGIAS:** 

ANTECEDENTES PERSONALES	TRATAMIENTO DOMICILIARIO

NECESIDADES ALTERADAS	DESCRIPCIÓN				
Respirar con normalidad	Sin alteraciones significativas.				
Comer y beber adecuadamente	Dieta absoluta hasta legrado, después dieta normal.				
Eliminar los desechos del organismo.	Control de la diuresis en postoperatorio inmediato.				
Movimientos y mantenimiento de postura adecuada.	Reposo las primeras horas, después actividad normal.				
Descansar y dormir	Afectado por dolor durante la fase de dilatación y por la afectación psicológica debida a la pérdida. El entorno hospitalario y las pautas de tratamiento pueden dificultarles el sueño.				
Seleccionar vestimenta adecuada.	Sin alteraciones significativas.				
Mantener la temperatura corporal	Puede estar alterada por el riesgo de infección por procedimientos invasivos.				
Mantener la higiene corporal Evitar los peligros del entorno	Afectada por la metrorragia derivada del tratamiento				
Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opiniones	Afectada por el proceso de pérdida del feto, por la preocupación sobre embarazos futuros y sentimientos de culpabilidad.				
Ejercer culto a Dios, acorde con su religión	Puede estar alterado.				
Trabajar de forma que permita sentirse realizado	Afectado debido a sentimientos de pérdida y culpa.				
Participar en todas las formas de recreación y ocio	Sin alteraciones significativas				
Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la sd	Búsqueda de explicación a lo ocurrido.				

<sup>\*</sup> Esta es una muestra de las actividades a realizar por cada intervención para conocer el total de las actividades que se aplican de esta intervención consultar la NIC

'ALORACIÓN DEL DIAGNOSTICO	DIAGNÓSTICOS	Factores de relación Factores de riesgo	CRITERIOS DE RESULTADO	INTERVENCIONES			
Fecha creación: Fecha resolución:	00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos	<ul> <li>Factores que influyen en la necesidad de líquidos</li> <li>Pérdida excesiva de líquidos a través de vías anormales</li> </ul>	0602 Hidratación 0601 Equilibrio hídrico	4120 Manejo de líquidos 2314 Administración de medicamentos IV 4020 Disminución de la hemorragia			
Fecha creación: Fecha resolución:	00095 Insomnio	<ul> <li>Ansiedad</li> <li>Temor</li> <li>Duelo</li> <li>Cambios hormonales</li> <li>Factores ambientales</li> <li>Interrupción por procesos terapéuticos</li> </ul>	0004 Sueño	1850 Mejorar el sueño			
Fecha creación: Fecha resolución:	00004 Riesgo de infección	Alteración de las defensas primarias: rotura de piel (flebotomía), Traumatismo de tejidos (endometrio).	0703 Severidad de la infección	6540 Control de la Infección 6550 Protección contra infecciones 1750 Cuidados perineales			
Fecha resolución: Fecha resolución:	00132 Dolor agudo	Agentes lesivos	2102 Nivel de dolor 1605 Control del dolor	2210 Administración Analgésicos			
Fecha creación: Fecha resolución:	00060 Interrupción de los procesos familiares	<ul> <li>Crisis de transición</li> <li>Situación de transición</li> <li>Cambio de rol</li> </ul>	1304 Resolución de la aflicción	5270 Apoyo emocional			
Fecha creación: Fecha resolución:	00136 Duelo	Pérdida de un objeto significativo (parte o proceso corporal)	1208 Nivel de depresión	5290 Facilitar el duelo			
Fecha creación: Fecha resolución:	00148 Temor	<ul> <li>Falta de familiaridad con la experiencia</li> <li>Estímulos fóbicos</li> <li>Hospitalización y procesos</li> </ul>	1210 Nivel de miedo 1404 Autocontrol del miedo	5240 Asesoramiento 5820 Disminución de ansiedad 5270 Apoyo emocional			
Fecha creación: Fecha resolución:	00153 Riesgo de baja autoestima situacional	<ul> <li>Pérdida</li> <li>Cambio de rol</li> <li>Expectativas irreales sobre sí misma</li> </ul>	1205 Autoestima	6950 Cuidados por cese de embarazo			
PROBLEMAS EN COLABORACIÓN	PRE	SCRIPCIÓN	INTERVENCIONES				
DERIVADOS DEL TRATAMIENTO	Reposo Analgesia, Occitócicos, Antibióticos Sueroterapia Administración de sangre o hemoderivados Dieta Inmunización si precisa		4200 Terapia IV 2304 Administración de medicación oral 2314 Administración de medicación IV 0740 Cuidados del paciente encamado 6950 Cuidados por cese de embarazo 4030 Administración de productos sanguíneos 1020 Etapas en la dieta				
DERIVADOS DE PRUEBAS	Exploración física Analítica		7680 Ayuda en la exploración 4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa 7820 Manejo de muestras 7690 Interpretación de datos de laboratorio				
DERIVADOS DEL PROPIO DIAGNÓSTICO	Cirugía/Anestesia Cateterización venosa Punción venosa		2900 Asistencia quirúrgica 2920 Precauciones quirúrgicas 2930 Preparación quirúrgica 2870 Cuidados postanestesia				