

SERVICIO:		Nº Historia Clínica:	
Unidad:		Nombre Paciente:	
Habitación:	Cama:	Fecha Nacimiento:	Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PRUEBA DE HIPOGLUCEMIA INSULÍNICA PARA ACTH Y CORTISOL ESPECIALIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

***¿DESEO SER INFORMADO** sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?

DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi familiar / tutor / representante legal:			
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)	DNI	FIRMA	FECHA
De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre " MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO " para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento			
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)	DNI	FIRMA	FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Paciente en reposo, en decúbito supino y sin fumar. Se coloca una cánula intravenosa 15 minutos antes de la primera extracción.

Se realiza una extracción basal de sangre para determinar ACTH y cortisol. Tras administrar 0,1 U de insulina rápida/Kg de peso (0,2 U/kg en caso de diabetes, Cushing y acromegalia y 0,05 U/Kg de peso en caso de insuficiencia suprarrenal), se hacen nuevas extracciones para determinar ACTH y cortisol a los 15, 30, 60, 90 y 120 minutos.

De no haber evidencia de hipoglucemia a los 45 minutos, se repetirá el pulso de insulina. Se controla pulso, tensión arterial y síntomas de hipoglucemia cada 15-30 minutos.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR

Valoración de la secreción de ACTH y cortisol.

ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO

Test de ACTH, mediciones basales (una sola extracción) lo que da una información insuficiente o incompleta sobre la respuesta de la glándula endocrina que se pretende estudiar.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

No realización del diagnóstico.

RIESGOS FRECUENTES

Síntomas de hipoglucemia (sudor, palpitaciones, somnolencia), dolor leve en la zona de punción, hematoma en la zona de punción.

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS

Desorientación, agitación, convulsiones, pérdida de conocimiento.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

Epilepsia, cardiopatía isquémica; hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal y/o tiroidea si no están correctamente sustituidos los déficit hormonales.

PACIENTE			
D/D^a			
<p>DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento</p>			
NOMBRE / APELLIDOS	DNI	FIRMA	FECHA
FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE			
D/D^a			
<p>DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento</p>			
TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE	DNI	FIRMA	FECHA
MÉDICO RESPONSABLE DR D/D^a			
<p>DECLARO haber informado al paciente y al familiar, tutor o representante del mismo del objeto y naturaleza del procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.</p>			
MÉDICO RESPONSABLE	DNI	FIRMA	FECHA