

<b>SERVICIO:</b>		<b>Nº Historia Clínica:</b>	
<b>Unidad:</b>		<b>Nombre Paciente:</b>	
<b>Habitación:</b>	<b>Cama:</b>	<b>Fecha Nacimiento:</b>	<b>Sexo:</b>

## CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PUNCIÓN-ASPIRACIÓN SUPRAPÚBICA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA

\*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?

<b>DESEO QUE LA INFORMACIÓN</b> de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi familiar / tutor / representante legal:			
<b>NOMBRE APELLIDOS (Paciente)</b>	<b>DNI</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre " <b>MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO</b> " para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento			
<b>NOMBRE APELLIDOS (Paciente)</b>	<b>DNI</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>

### IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La punción suprapúbica es un procedimiento invasivo rápido, simple y seguro para el diagnóstico correcto de infección urinaria que consiste en obtener una muestra de orina mediante la punción con una aguja, a través de la parte baja de la pared abdominal donde se encuentra la vejiga urinaria.

Es un procedimiento diagnóstico extremadamente útil que los médicos realizamos con mucha seguridad, no requiere anestesia general y se realiza en un ambiente próximo a la cama del niño.

Estando el paciente acostado de espaldas y sostenido por ayudantes, el médico, bajo condiciones de higiene y limpieza apropiadas, introduce en la parte baja del abdomen una aguja delgada (unida a una jeringa descartable) hasta alcanzar la vejiga urinaria; en este momento la aspiración de la jeringa permitira obtener la muestra de orina y esta será recolectada para su pronto envío al laboratorio.

Se empleará si es necesario anestesia local (gel anestésico) para minimizar el dolor.

### OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR

A diferencia de otros métodos de recolección de orina la probabilidad de diagnosticar correctamente la presencia de una infección urinaria en un niño pequeño es elevada.

Lo contrario ocurre con una muestra de orina obtenida por medio de una bolsa colectora autoadhesiva; con ella la probabilidad de diagnosticar erróneamente una infección urinaria es elevada.

De no realizarse el procedimiento no se podrá obtener una muestra de orina fiable para realizar el examen, la incertidumbre diagnóstica continuará y los riesgos para el paciente aumentaran por la imposibilidad de tener un diagnostico definitivo y tratamiento adecuado.

En el caso particular de una posible infección del tracto urinario su verdadera presencia no podrá ser demostrada.

### ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO

La siguiente alternativa para obtener una muestra de orina confiable es el sondaje vesical transuretral.

Este procedimiento igualmente es invasivo, simple y seguro que consiste en la extracción de una muestra de orina mediante la introducción de una sonda a través de la uretra hasta alcanzar el interior de la vejiga urinaria.

Su desventaja es que no permite descartar totalmente el riesgo de contaminación de la orina obtenida y hay mayor riesgo de infección local y posible trauma uretral.

### CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

La punción suprapúbica permite el adecuado diagnóstico de la enfermedad de su hijo/a.

**CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN**

Dificultad o imposibilidad de diagnosticar correctamente la enfermedad de su hijo/a.

**RIESGOS FRECUENTES**

A pesar de que el procedimiento ha sido realizado correctamente desde el punto de vista técnico siempre pueden presentarse efectos indeseables o complicaciones. Las complicaciones en general son pocas frecuentes. Lo más común es que aparezca un sangrado urinario transitorio visible solamente con microscopio o visible a simple vista.

**RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS**

Las infecciones del sitio de la punción, llamadas celulitis o abscesos de la pared abdominal son raras al realizarse el procedimiento en condiciones estériles. Otras complicaciones poco frecuentes son sangrados locales en el sitio de la punción; estos aparecen con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades de la sangre o en aquellos tratados con fármacos anticoagulantes. Excepcionalmente se han descrito perforación intestinal, peritonitis, inoculación de una infección o una fístula vesical.

**RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES**

Antes de realizar el procedimiento, el pediatra valorará cuidadosamente la situación clínica del niño/a a fin de identificar posibles condiciones que desaconsejen su práctica. Cada caso es evaluado de forma individual.

**CONTRAINDICACIONES**

1. Vejiga vacía. No se debe realizar una punción suprapúbica si el niño ha orinado en la media hora anterior.
2. Grandes visceromegalias.
3. Anomalías congénitas del tracto intestinal y/o genitourinarias graves.
4. Alteraciones de la coagulación o trombopenia.
5. Deshidratación grave.
6. Distensión abdominal.
7. Cirugía abdominal reciente.

<b>PACIENTE</b>			
<b>D/D<sup>a</sup></b>			
<b>DECLARO</b> que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento			
<b>NOMBRE / APELLIDOS</b>	<b>DNI</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE</b>			
<b>D/D<sup>a</sup></b>			
<b>DECLARO</b> que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento			
<b>TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE</b>	<b>DNI</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>MÉDICO RESPONSABLE DR D/D<sup>a</sup></b>			
<b>DECLARO</b> haber informado al paciente y al familiar, tutor o representante del mismo del objeto y naturaleza del procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.			
<b>MÉDICO RESPONSABLE</b>	<b>DNI</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>