

## **¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO CON CLORURO DE ESTRONCIO/ SAMARIO?**

El cloruro de Estroncio y el Samario son fármacos inyectables desarrollados para calmar el dolor óseo causado por su enfermedad. Son químicamente parecidos al calcio. Se fijan en cualquier área donde los huesos estén absorbiendo mayor cantidad de calcio y causando dolor, y permanecen en ella durante muchas semanas haciendo que el dolor disminuya.

Durante muchos años los médicos han usado ciertos tipos de radiación con el objetivo de calmar el dolor sufrido por personas como usted. Estos fármacos contienen pequeñas cantidades de una forma especial de estroncio radiactivo que sólo se localiza donde es necesario.

### **¿POR QUÉ ME HAN PRESCRITO TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO?**

Para muchas personas estos fármacos son más apropiados que otros tipos de terapia. Se le han prescrito a usted porque será el tratamiento más adecuado en su caso (dolor óseo).

### **¿QUE EFECTOS TENDRÁ EL CLORURO DE ESTRONCIO/ SAMARIO?**

Al principio no notará ningún efecto. A lo mejor sentirá un ligero aumento en el dolor durante los dos o tres días después de la inyección. Esto es completamente normal y es posible que tenga que aumentar un poco la dosis de calmantes hasta que se calme el dolor.

Al cabo de unas dos semanas, o quizá un poco más tarde, notará que el dolor disminuye. Esta reducción del dolor continuará y el efecto durará varios meses.

### **¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO HACER?**

La inyección no le impedirá hacer lo que normalmente hace. Cuando el fármaco empiece a disminuir el dolor, notará que puede con actividades que antes eran demasiado difíciles o dolorosas. Si tiene alguna duda, diríjase a su médico. Este tratamiento no tendrá efectos sobre su capacidad de conducir, ni de empleo de maquinaria.

### **¿A QUIÉN TENGO QUE DECÍRSELO?**

Tiene que decir a cualquier médico que le esté tratando que ha recibido Cloruro de Estroncio / Samario y mostrarles este folleto.

### **¿HABRÁ ALGUNOS EFECTOS SECUNDARIOS?**

Normalmente no notará ninguno. Puede comer y beber como de costumbre y no hay que evitar el alcohol, a no ser que le hayan aconsejado hacerlo por otros motivos. Puede haber un ligero descenso en el número de células sanguíneas y su médico querrá practicar pruebas rutinarias. Todo esto es muy normal. Si tiene alguna preocupación, no dude en consultar a su médico.

### **¿DEBO DEJAR DE TOMAR CALMANTES?**

Es posible que su médico le aconseje seguir tomándolos hasta que el dolor comience a disminuir. Después le propondrá comenzar a reducir la dosis gradualmente. A lo mejor desea usted continuar reduciendo la dosis y eventualmente puede que ya no necesite sus calmantes en absoluto. Si tiene cualquier duda, consulte a su médico.

### **¿HAY TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS?**

Si hace falta, su médico le aconsejará qué otros tratamientos puede seguir.

### **¿QUÉ PRECAUCIONES TENGO QUE TOMAR?**

Los efectos del fármaco dentro del cuerpo se limitan a las pequeñas áreas dolorosas en las que se concentra. Por eso no causará daño a otras personas por contacto corporal.

¡Una sola advertencia!. Durante la primera semana después de la inyección, el Cloruro de Estroncio /Samarium estará presente en la sangre y la orina. Por eso es importante que tome las siguientes precauciones durante 7 días:

- Si hay un servicio normal disponible es mejor emplear éste que un orinal. Hay que tirar de la cadena dos veces.
- Si hay orina derramada, séquela con un papel absorbente y arrójele al servicio.
- Procure siempre lavarse las manos después de haber ido al servicio.
- Lave inmediatamente la ropa interior o las prendas manchadas de orina por separado y enjuague muy bien.
- Si emplea algún dispositivo para recoger la orina, consulte a su médico de cabecera en cuanto a su empleo.
- Si se llega a cortar, elimine con agua la sangre derramada.

**Si tiene alguna duda llame o acuda al Servicio de Medicina Nuclear.**